


A  
N  
L  
S



ONES

R A T E

R I M V M D E

R A E C I P V A R V M

R V M D E S C R I P T I O .

uam in Sylua Hercynia  
is habentur.

H I M O C A M E R A R I O  
mberg. Medico D.



cofurti ad Mænum.

LXXXVIII.

ICONES  
ACCVRATE  
NVNC PRIMVM DE-  
LINEATAE PRAECIPVARVM  
STIRPIVM, QVARVM DESCRIPTIO-  
nes tam in Horto quam in Sylua Hercynia  
suis locis habentur.

AVTORE IOACHIMO CAMERARIO  
*Reipub. Norimberg. Medico D.*



*Impressum Francofurti ad Mœnum.*

*M. D. LXXXVIII.*

ICONES

ACCVARATE

INVCPRIMVMDE

LINAEAE PRAECITVARVM


STIRPVM QVAVM DESCRIPITIO

restam in Horto pum in Sylva Hercynia

his locis habentur

CAVTORE VONCHINO CAMERARIO

Reich. Nymphenburg. Biblioth. D.



Imprimus: Typographus: Johann: Schöner: 1711

M. D. LXXVIIII



*Abutilon Indicum. Hort. Pag. 3.*



Imago hæc ex altera parte florem, ex altera semen  
cum ipsius conceptaculo appicta ostendit.

Aa 2

Aizoon



*Aizoon peregrinum.* Pag. 7.

Pingitur hic tam nouellum quam adultum, & se-  
 paratim quoque flosculus iustæ magnitudinis, & se-  
 men ex vasculo suo excidens.

noosia

s. s. A.

Alcea

*Alcea arborescens.* Pag. 9.

Plantulam hic exhibemus, qualis apud nos enata  
fuit ex semine. Florem vero communicavit CL. Vir  
D. Rauvolfius.



*Alcea arborescens.* Pag. 9.

Ramus hic adiectus est, ne adultæ plantæ imago  
 foliorum acumine aliquantum varians desideraretur.  
 Acceptum autem ferimus & hunc CL. Viro D.  
 Rauvvolfio.





Huius altitudo ex appicti floris quantitate medio-  
eriter conijci potest. Accurata descriptio extat apud  
Cæsalpinum. Nos iconem dedimus, cum à nemine  
hactenus depicta fuerit.

VI.

*Althæa Thuringica. Pag.12.*



\* Folium ex flore decerptum, † semen, Y Radicis  
 crassitudo denotatur vt integra plantæ statura non-  
 nihil hinc æstimari liceat.



## VII.

*Aphyllanthes Anguillara.* Pag. 18.



Petrus Pena solus hanc plantam Globulariæ nomine delineavit, sed nonnihil accuratius geminam ipsius differentiam Gesnerus expressit, qualem ex imagine subiecta contemplari licet.

Bb

Auricu-





† Flosculorum alter simplex depingitur, \* alter, (quod frequenter admodum contingit in hac planta) ingeminos quasi detortus. Adjicitur quoque seminis folliculus integer, & alius dissectus ut grana intus latentia intueri possis.



Vnus Tragus hanc depinxit, & ex hoc postea omnes transtulerunt. Nos aliquantum emendauimus & semen adiecimus hac nota † insignitum.



*Carduus lacteus Syriacus.* Pag. 35.

Quod nostræ plantæ, cuius in horti catalogo meminimus, deerat, ex D. Rauvvolfij sicca suffecimus. Proportio vero totius ad hanc imaginem erat quadrupla.





Flosculi seorsim tantilli exprimuntur, quanti re-  
uera sunt, quemadmodum & semen hic ostenditur  
quantitate iusta, vt inde tota planta aestimetur.

## XII.

*Corcorus. Pag. 47.*

In Lobelij herbario integre proponitur. Desunt  
tamen semina & foliorum barbulae, quæ tali figura  
expressimus.

Genista



*Genista Sagittalis Pannonica. Pag. 64.*

Hic indicatur 1. tota planta, 2. foliorum & 3. florum mediocris quantitas.



XIIII.

*Genista transalpina.* Pag. 65.



Ex flore & siliquis seorsim effigiatis integræ stirpis  
mensura facile haberi potest.

Gentia-

*Gentianella elegantissima* Bauarica. Pag. 65.

- I. Maiuscula est & radiculis reptantibus prædita.  
 II. Minor, folijs breuioribus & rotundioribus. Folia  
 floris quina sunt, rarius sena.





Extat etiam icon apud CL. D. Rauvvolfium, sed elegantissima semina ibidem nimis confusa & obscurata negligentiam pictoris arguunt.



Inferiore parte flores duo appinguntur, alter supinus, & alter pronus è suo conceptaculo vulsus. Deinde etiam fructus in involucri suo amictus & eodem exutus, nec non dissectus vt semina appareant, quæ & ipsa separatim apposita visuntur.



XVIII.

*Hesperis Pannonica.* Pag. 74.



Flos & siliqua valvulis apertis, & seorsim appositum semen hic ostenduntur.

Hespe-

## XIX.

*Hesperis Syriaca.* Pag. 74.

Pingitur floribus & semine onusta. Nam antequā  
 caulescat, foliorum longe alia facies est. 1. Flosculi  
 mediocris quantitas, 2. tertia siliquæ pars & semina  
 intus contenta integræ plantæ staturam innuunt.

Cc 3

*Hesper-*



*Hesperis Syriaca* *sue* *Leucoium marinum*

D. Rauwolfj. Pag. 74.



Hanc Tripoli spontaneam inuenit ille, & me quoque aride plantę fecit participem. Videtur autem ob locos natales & exiccationē nonnihil strigosior præcedente, alioquin parum diuersa. Ideoq; ex aduerso illi collocaui, vt aliorum de ea sit iudicium.

Hyoscya-

*Hyoscyamus Syriacus. Pag. 77.*

Ipsa plantā plerunque huius iconis quantitatem  
quater in se continere deprahenditur.

Hyoscy-



*Hyoscyamus peculiaris. Pag. 77.*

Florum alter suo calyce hærens, alter euulsus hic  
 monstratur, nec non seminis vasculum, membrana-  
 ceo munimento dissecto, & amoto operculo.



Arbor hîc exigua pingitur. Flos autem, quorum plures racematim nascuntur, & folium, fructusque dissectus cum nucleo exempto mediocrem magnitudinem præ se ferunt.



XXIII.  
*Leucoion Marinum.* Pag. 87.



Flosculi, & semen in cruciformibus siliquis nec  
non folium iustæ magnitudinis vna cum totius plan-  
tæ pictura oculis hic subijciuntur.

Lotus

*Lotus peculiaris siliquis ornithopodij. Pag. 91.*



Flosculus, folium & siliqua cum semine nativam  
quantitatem liquido demonstrant.



*Lotus pulcerrima tetragonolobus.* Pag. 91.

Ex adiectis particulis patet foliorum, florum & seminum magnitudo. Siliquæ additur granum integrum vnum, & alterum dissectum.



Seorsim depinguntur flosculi, folliculi & semen  
 magnitudinem genuinam præ se ferentia.





Hanc admodum exquisitè C. Clusius in Hispânicis obseruationibus delineauit. Nos hic exprimere volumus flosculos & semen cum suis corniculis, & præterea discrepantiâ ramulorum, qui dum nouelli sunt flosculos & folia maiuscula edunt, per ætatem vero cum ijsdem subinde minuuntur.



\* Foliorum maxima & media quantitas hinc evidens existit, vt & Flosculorum seminumque ex adiectis portiunculis. Videmus in quibusdam vasculis bina in reliquis vnicum tantum granum contineri.





Præter C. Clusium in observationibus Pannonicis  
 nemo hanc satis accurate depinxit. Ideo nostram  
 quoque Iconem hic proponere volumus, addito  
 flore & semine cum suo folliculo.



Hæc est vera imago eximiæ huius plantæ, qualem  
ad viuum ab industrio pictore exprimendam curaui-  
mus.

Ec Flores





Quia in icone diminuta necessario quædam obscuriora red-  
duntur, flores & semen cum triquetro vasculo iusta quantitate  
noluimus desiderari, nec non folia superiora quæ inferiorum  
nonnunquam vix sunt pars septima: vt hinc metiri facile totam  
proportionem queas.



Iuxta integram stirpem collocatum cernis florem  
 integrum & folium floris cum stamine annexo euul-  
 sum. Seminis item racemulum, & grana separata, &  
 pericarpium integrum.





Hic quoq; deprehendes capsulam seminis, & racemulum, cum exidentibus granis,



Flosculi appicti sunt conuenienti magnitudine,  
 vt & vasculum è quo semina puluisculum referentia  
 excidunt;.





Hac forma ex sui ossis parte, quæ rimæ opponitur, enasci solet Palmæ germen, & primo in radicem descēdere, mox sursum protrudere quoq; folium. Pingitur autem os oblongius, quale est dactylorum Alexandrinorum.

*Perfoliata crispa seu muscosa. Pag. 120.*



Segregauimus florē huiusmodi crispum seu muscosum ex reliquis, & rursum ex hoc pusillum flosculum, vt distinctius omnia contemplanti apparerent.

Perfo-





Considerandi sunt hic flosculi conglomerati in suo foliaceo cōceptaculo aduersa & auersa parte expresso, iidemq; separatim adiecti, & semina dense stipata, nec non seorsim pictum granum.

Phasco-



Folium, flos, siliqua & semina adiuncta de totius  
plantæ statura coniectanti auxilio sunt.

Ff

Quamo-





Inferiøre parte adiectum vides folliculum integrum, & alium effractum, semotas quinque laminulas, & exempta semina quina. Nimis vero tenella hic planta depingitur, ideoque aliquando pleniorẽ imaginem vulgabimus.



Exhibemus plantam nouellam & adultam. Appo-  
suimus & aridam in se conglobatam, qualis vulgo  
vêditur. Folium, flosculi, & semina cum suis vasculis  
parte superiore in conspectu sunt.





D. Leonardus Rauvolfius hanc nobis communicavit in Syriæ ruderibus collectam.

Scro-



Flosculi è suo conceptaculo euulsi, parte anteriore & posteriore, & vnus eidem adhuc inhærens, denique semen cum suo vasculo distincte hic notari possunt.





D. Rauvvolſij munere hic ſpectatis flores genuinos, quorum alter diſciſſus pingitur, vt ſtamina intus latentia in conſpectum veniant. Vaſculum quoque dimidium & appoſita ſemina.

Sphæro-

*Spharocephalus annuus.* Pag. 163.

\* Echinati capitis portiunculam hic aspicias, cui flosculus inheret, & † eundem flosculum nudum, seminis rudimento insidentem, inferiore autem parte semen maturum, cum hirsuto munimento quo continetur & quem continet, nucleo.





Præter integram plantam, flosculi, fructus & semina in hac imagine conspicua sunt.

Trifo-



Quanta sit planta colligere licet ex folio, flore, fol-  
liculo, siliquula intus absconsa eademque exempta,  
& semine, quæ singula seorsim picta in conspectu  
sunt.



# Hercyniarum stirpium Icones.

I.

*Astragalus Sylvaticus.* Pag. 7.



Folium vnicum & filiqua cum semine de totius  
plantæ quantitate testantur.

Cony.

*Conyza maior altera.* Pag. 21.

Folium mediocris magnitudinis & flos, vno foliolo & pusillis intus florculis euulsis appicta visuntur.



III.

*Conyza maxima serratifolia.* Pag. 21.



Huius quantitas diligenter in descriptione indicatur.

Cerui-

IIII.

*Cervicaria maior tenuifolia.* Pag. 32.



Flos tantum adijcitur. Semen est idem quod reli-  
quarum huius generis plantarum.

Gg 3.

Gera-





Pingitur quale per hyemem sine caule durat, & ostenditur integra quoque planta, flore & semine onusta. Particulatim etiam flos & semen addita conspiciuntur.

*Orobus Syluaticus vernus. Pag. 80.*

Folium, florem, siliquas & semen separatim ap-  
pinximus.



## VII.

*Pilosella filiquata.* Pag. 84.

Triplex hæc pingitur. C. non describitur ab autore  
 sed his à Gesnero vt cognata fuit adiecta. D. Minor  
 species à qua parū discrepat maior quemadmodum  
 descriptio ostendit. E. minima, de qua vide Lobeliū.

Rapun-

## VIII.

*Rapunculus Sylvestris umbellatus.* Pag. 94.



Huius tres differentias hic depinximus congenere-  
res ijs quas autor descripsit, quamvis non easdem.

Hh

Salsi-





Duplex hic varietas observari potest. 1. Masculus  
breuior est ac totus rubet. 2. femella, vbique notis-  
sima.

# ΕΙΣ ΚΗΡΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΝ.

Ἡ χαλὸς ἔτ' ὁ καὶ πῦρ, ὅκου χαλὰ τόσσα πεφύκει,  
 ἄνθεα πορφυρέας αὐλακῶ ἀγλαΐα.  
 Ἡ χι καὶ ἀλθιέντα νόσων ἀκλήρεια ποιαὶ  
 τοσάπαι καπυρὰν ἐξανίστι πνοῶν.  
 Μύρια τ' ἄλλοδάπων χθονὸς ἐπὶν ἐθήμονι πόλπω  
 βλάσων καὶ ξενικῶ θάλαπ' ἀελίῳ.  
 Ταῦθ' ἄμα καπύρου πόντῳ ἥδ' ἄμπαυμα τέτυκται,  
 ἀλλὰ τὰδ' ὅσα βλέπεις, τοὶ ξένοι καρποφορεῖ.  
 Ἰχεὺς δὲ οἷα μέλισσα σοφὸν νόον, ὅκκ' ἐκορέσθης  
 νέκλει, μὴ βλάπῃεν ἄνθεα μηδ' ὀλέσται.  
 Μὴ μὲν λωβέσσηδε τὰδ' ἄνθεα, μήτε τὰς αἶας  
 τὰς δεχλὸας φθογεῶν δάγματ' αἰ τρωξαλίδων.  
 Φεύγε καὶ καθαρίδες, κακὰ θηρία, φεύγε καὶ χάμπα,  
 ὕμμι γδ' ἐφύεται ταῦτα τὰ χορῶδ' αἶμα.

ὁ Αναστάσιος Ἀγῆραλ.

## EIVSDEM.

*Hic Panacea sibi posuit cum Chloride sedes,  
 Et meruit gemini numinis hortus opem.  
 Hunc etenim Hippocratis pariter geniusq; Cratena,  
 Et Camerariada dextra perita colit.*

Hh 2

M. VI-



M. VITRUVIUS POLL. DE ARCHITECT. LIB. VIII.

**Q**UOD si terra generibus humorum non esset dissimilis, & disparata, non tantum in Syria & Arabia in arundinibus & iuncis, herbisque omnibus essent odores, neque arbores thuriferæ, neque piperis darent baccas, nec myrrha glebularas, nec Cyrenis in ferulis laser nasceretur: sed in omnibus terræ regionibus & locis eodem genere omnia procrearentur. Has autem varietates regionibus & locis inclinatio mundi & solis impetus, propius aut longius cûsum faciendo, tales efficit terræ humores, quæ qualitates non solum in his rebus, sed etiam in pecorib. & armentis discernuntur. Hæc non ita dissimiliter efficerentur, nisi proprietates singularum terrarum in regionibus ad solis potestatem temperarentur.

VIRG. II. GEORG.

**N**Ec vero terra ferre omnes omnia possunt.  
Fluminibus salices, crassisque paludibus alni  
Nascuntur, steriles saxosis montibus orni:  
Littora myrteris latissima, denique, apertos  
Bacchus amat colles, aquilonem & frigora taxi.  
Aspice & extremis domitum cultoribus orbem,  
Eoasque domos Arabum, pictosque Gelonos:  
Diuisæ arboribus patriæ: sola India nigrum  
Fert ebum, solis est thurea virga Sabæis.  
Quid tibi odorato referam sudantia ligno  
Balsamag, & baccas semper frondentis acanthi?  
Vellerag, ut folijs depectant tenuia Seres?

*Aut quos Oceano propior gerit India lucos,  
 Extremi sinus orbis, ubi aëra vincere summum  
 Arboris haud ulla iactu potuere sagittæ.  
 Et gens illa quidem sumptis non tarda pharetris.  
 Media fert tristes succos tardumq; saporem  
 Felicis mali: quo non presentius ullum  
 (Pocula si quando sene infecere nouerca  
 Miscueruntq; herbas & non innoxia verba,)  
 Auxilium venit ac membris agit atra venena.*

## ERRATA IN HORTO.

Fol. 1. lin. 15. leg. Abrotanum. 8. 30. Alcea Pannonica. l. Peregrina.  
 9. 2. Non habetur &c. deleantur illæ tres lineæ & substituatur. Non  
 hanc spontaneam in Pannonia Clusius obseruauit, sed Ferrarijs à  
 Cl. V. Alphonso Pancio primum fatetur se accepisse. 9. 6. Pannoni-  
 ca, lege peregrina modo dicta. 17. 26. Chamepyxum. 33. 24. Cappa-  
 ris fabago. 45. 8. enemata. 14. sponte. 47. penult. Dacrydij. 51. 26. Cy-  
 claminus. 57. 29. siue Orobus. 73. 19. cum minore. 88. 23. *ἀνίγ.* 95. 22.  
*Σεσμῶς.* 102. 6. Sassafras. 102. 12. Caucason. 172. 1. apud nos non fert.  
 173. 23. Lilionarcissum. 178. 25. Pseudoguaiacana.

## IN SYLVA HARC:

5. 11. quasi lege quali. 10. 29. fructus quoque idem. 15. 5. Harcyniæ.  
 22. 7. angulosa. 23. 8. Dens leonis. 28. 27. Minori. 31. 3. scabros. 51. 1. tu-  
 ber. 55. 22. flore rubro. 61. 10. piæq; 90. 13. *φλομῖς.* 94. 2. communior.  
 95. 5. Rapunculus. 104. 31. Gratiolæ ferè. 109. 11. Bellidis.



IMPRESSVM FRANCO-  
FVRTI AD MOENVM, APVD IO-  
HANNEM FEYERABEND, IMPENSIS SI-  
gismundi Feyerabendij, Heinrichi Dackij,  
& Petri Fischeri.



M. D. LXXXVIII.

